

水 稲 管 理 情 報

令和4年7月
J A 志 賀
能登南部営農推進協議会


緊急

カメムシ防除で斑点米防止！

昨年に引き続き多発

捕獲したカメムシの大部分は飛翔性で、 広範囲に被害の拡大が懸念…

- ◇ カメムシ類は、農道・畦畔等の雑草地で生息数を増加させ、今後、水稻の出穂に合わせて本田内に侵入し吸汁・加害を繰り返します ⇒ **不稔粒・斑点米の発生!!**
- ◇ 「農道・畦畔等の除草」に引き続き、「**3回防除を徹底**」しましょう。



防 除 の ポ イ ン ト

- ◇ 品種に合わせ、**①出穂直前、②出穂7日後、③出穂14日後の3回防除**を必ず実施しましょう。
- ◇ 無人ヘリ防除が2回散布の場合は、**3回目は個人防除**で対応してください。
- ◇ **7月中旬以降の草刈りは薬剤防除の直前に行いましょう。**

時 期	薬 剤 名 (粉剤体系)	成分数
【防除1回目】出穂直前	トレバリダビーム粉剤DL	3成分
【防除2回目】出穂 7~10日後	ラブサイドキラップ粉剤DL	2成分
【防除3回目】出穂 14~17日後	キラップ粉剤DL	1成分

※ キラップに含まれる成分 (エチプロール) の総使用回数は2回まで