



能登やさしいこめづくり情報

【速報】 中生穂肥情報

生育観測（6/29）の結果から予想される「コシヒカリ」の出穂期は

7月24日～28日頃（5月上旬移植ほ場）です。

【志賀米・能登米・慣行米コシヒカリの分施肥体系】

- ・生育過剰なほ場や葉色が濃いほ場では、1回目の穂肥時期は遅らせず、量のみを減らして施用してください。
- ・1回目が施用出来なかった場合でも、**2回目の穂肥は必ず施用して下さい。**（**稲体の消耗を防ぎ登熟向上を図る**）。
- ・エコ栽培（3割減）の場合は、化学窒素施用量に気をつけましょう。

出穂期 予想	肥料名	回数	実施時期の目安		基準施用量
			幼穂長・ 葉耳間長	本年	
7/26頃	BB追肥550号 (化学N100%)	1回目	幼穂長1～3mm 葉色4.0未満	7月10日頃 (出穂16日前)	10～15kg/10a
		2回目	葉耳間長±0 cm	7月16日頃 (出穂10日前)	10～15kg/10a
	BB能登みのり (化学N60%)	1回目	幼穂長1～3mm 葉色4.0未満	7月10日頃 (出穂16日前)	10～15kg/10a
		2回目	葉耳間長±0 cm	7月16日頃 (出穂10日前)	10～15kg/10a
	BB有機入り 能登穂肥一発 (化学N60%)	1回 のみ	幼穂長1～3mm	7月10日頃 (出穂16日前)	20kg～30kg/10a

※ 2回目の追肥は規定通り施用しましょう！！

【基肥一発肥料体系での上乘せ追肥】

- ・基肥一発肥料では、基本的には追肥の必要はありませんが、
①登熟期の高温による栄養凋落の防止 と ②収量の向上のため、
必要に応じて上乘せ追肥を実施しましょう。
- ※「BB有機入り能登コシー一発DX」を施用の場合、上乘せ追肥は原則不要です。

施用時期	葉色	肥料名	10aあたり施用量
出穂7～10日前 (葉耳間長0～2cm)	4.0未満	BB追肥550号	7～10kg (N:1～1.5kg)